

Nuevo registro del Chorlo pecho colorado (*Charadrius modestus*) en el Chaco paraguayo

TATIANA GALLUPPI-SELICH

Guyra Paraguay, Parque Capital Verde, CC 1132, Asunción, Paraguay
tatiana.guyra@gmail.com

GUILLERMO MENÉNDEZ

Consultor independiente

MILAY CHAVES

Consultor independiente

RESUMEN

El Chorlo pecho colorado (*Charadrius modestus*) es una especie migratoria de la familia Charadriidae, la cual posee siete especies registradas para Paraguay. Presentamos el primer registro de la especie para la localidad de Laguna Capitán, Departamento Presidente Hayes, Área de Importancia para las Aves (IBA). Esta especie fue documentada por primera vez hace 14 años en el mismo departamento, en la localidad de Laguna Sanidad, Estero Patiño a 144 km en dirección sur-suroeste de la nueva localidad.

PALABRAS CLAVE: distribución, migrador austral, Charadriidae, aves playeras

El chorlo pecho colorado (*Charadrius modestus*) es una especie de la familia Charadriidae, la cual posee siete especies registradas en el Paraguay donde tres son migratorias neárticas. Esta especie posee una distribución restringida al Sur de Sudamérica, ocupando en época reproductiva (en la mayoría de los casos de octubre a noviembre) el centro-sur y el sur de Chile, sur de Argentina y las Islas Falkland/Malvinas. Durante el invierno austral (abril-agosto) la mayoría de los individuos migran hacia el norte de Chile, Argentina, Uruguay y al sur de Brasil, llegando ocasionalmente a los estados de São Paulo y Río de Janeiro (Piersma 1996, Simpson y Simpson 2011) y al Perú (Schmitt y Pariset 2005). Debido a este patrón de migración, podemos denominar a esta especie como migrante austral.

C. modestus fue descrita por Hayes (1995) como una especie hipotética pero posible para Paraguay debido a un único registro de Contreras (1989) a orillas de una pequeña laguna cercana a la estancia Co'e Py'ahu en el departamento de Boquerón en setiembre del 1989. Éste es considerado el primer registro de la especie en el país, para luego documentarse por primera vez en Paraguay en la localidad de Laguna Sanidad, Estero Patiño (Departamento de Presidente Hayes) en junio del 2004 (Lesterhuis y Clay 2011), fecha desde la cual no se poseen registros de la especie en el país.

Durante una visita en mayo del 2018 al campamento Laguna Capitán (Departamento de Presidente Hayes, Paraguay), se

ABSTRACT

Rufous-chested Dotterel (*Charadrius modestus*) is a migratory bird of the Charadriidae family, seven species of which have been recorded in Paraguay. Here we present the first record for the locality of Laguna Capitán, Department of Presidente Hayes, an Important Bird Area (IBA). This species was documented for the first time 14 years ago in the same department, in the locality of Laguna Sanidad, Estero Patiño, 144 km south-south-east of the new locality.

KEY-WORDS: distribution, austral migrant, Charadriidae, shorebirds

ha registrado a un individuo de *C. modestus* con plumaje invernal al borde de la laguna a aproximadamente 1.000 metros de las instalaciones del alojamiento a las 10:30 a.m. (22°32'22.5"S 59°40'28.7"W). El individuo se encontraba alimentándose a orillas de la laguna, acompañado de otras especies de aves playeras como el Chorlito de collar (*Charadrius collaris*) y el Playerito rabadilla blanca (*Calidris fuscicollis*) (Fig. 1). El mismo fue identificado gracias a la frente y amplia ceja blanca características de la especie (Hayman et al. 1986, Rocca y Aldabe 2012) y el pecho bien marcado (Fig. 2).

El registro se da luego de 14 años desde la última documentación de la especie para Paraguay y se sitúa a 144 km en dirección noreste del primer registro documentado (Fig. 3); siendo así, el segundo registro documentado para el Chaco paraguayo. Esta localidad forma parte del sistema de lagunas saladas del Riacho Yacaré, las cuales conforman una de las 57 Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA por sus siglas en inglés, PY010). Este sitio fue calificado como IBA bajo los criterios A1, A3, A4i, A4iii; los cuales hacen referencia a las especies migratorias amenazadas a nivel internacional registradas en el área, a las especies restringidas a un bioma y por albergar una gran concentración de aves acuáticas y aves playeras en épocas de migración (BirdLife International 2007, Guyra Paraguay 2008). A pesar de ello, este sitio no se encuentra bajo el sistema de áreas silvestres protegidas a nivel nacional.



Figura 1. Individuo de Chorlo pecho canela (*Charadrius modestus*, centro), junto con Playerito rabadilla blanca (*Calidris fuscicollis*, izquierda) y Chorlito de collar (*Charadrius collaris*, derecha). Foto: Guillermo Menéndez.



Figura 2. Individuo de Chorlo pecho canela (*Charadrius modestus*). Foto: Guillermo Menéndez.

Paraquaria Nat. 6(1): 26 - 29

ISSN 2309-5237

© Del/de los autor/es.

Es con licencia exclusiva a Guyra Paraguay.

http://guyrap.org.py/paraquaria/
art1:paraquaria61

Recibido: 24 de mayo de 2018

Aceptado: 17 de junio de 2018




Figura 3. Localización de registros de *Charadrius modestus* en Paraguay. Las figuras rojas representan los registros documentados y la figura negra al primer registro de la especie. Realizado por Tatiana Galluppi-Selich

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Arne Lesterhuis por la ayuda en la identificación de la especie, a Viviana Rojas por sus comentarios en el manuscrito, a Guyra Paraguay por hacer posible la visita al sitio y a la Cooperativa Chor-titzer por alojarnos y darnos la oportunidad de registrar la biodiversidad del sitio.

REFERENCIAS

BirdLife International. 2018. *Important Bird Areas factsheet: Lagunas Saladas - Riacho Yacaré* en: <http://www.birdlife.org>. Consultado el 05/06/2018.

Contreras, J.R. 1989. La avifauna de la Estancia Co'e Pyahú y sus cercanías, Nueva Asunción, República del Paraguay. *Nótulas Faunísticas* 17: 1-6.

Guyra Paraguay. 2008. *Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en Paraguay*. Guyra Paraguay/BirdLife International, Asunción. 473pp.

Hayes, F.E. 1995. Status, Distribution and Biogeography of the Birds of Paraguay. American Birding Association. *Monographs in Field Ornithology* No. 1. 230pp.

Hayman, P., J. Marchant y T. Prater. 1986. *Shorebirds: An identification guide to the waders of the world*. Christopher Helm Ltd., London. 412pp.

Lesterhuis, A.J. y R.P. Clay. 2011. Confirmation of the occurrence of Rufous-chested Dotterel and Semipalmated Plover in Paraguay. *Wader Study Group Bulletin* 118(2): 127-128.

Piersma, T. 1996. Family Charadriidae (Plovers). En: del Hoyo, J., A. Elliot y J. Sargatal (Eds.) *Handbook of the Birds of the World*. Vol. 3. Hoatzin to Auks. Lynx Edicions, Barcelona. 439pp.

Rocca, P.I. y J. Aldabe. 2012. *Chorlos y playeros migratorios de la Laguna de Rocha: Manual para su identificación y conservación*. Aves Uruguay, Montevideo. 86pp.

Schmitt, F. y P. Pariset. 2005. Third record of Rufous-chested Plover *Charadrius modestus* in Peru. *Cotinga* 24: 111.

Simpson, R. y E., Simpson. 2011. Registro documentado da batuíra-de-peito-tijolo *Charadrius modestus* (Charadriiformes: Charadriidae) em Paraty, Rio de Janeiro. *Atualidades Ornitológicas* 162: 18-19.